

# 新型コロナワクチン接種について VOL19

松浦市では、9月30日をもって従来型ワクチンを使用した3回目・4回目接種を終了し、**初回接種(1・2回目接種)を終了した方を対象に、10月5日からオミクロン株対応2価ワクチン**での3回目・4回目接種を開始します。

## オミクロン株対応2価ワクチン接種対象者

### 初回接種(1・2回目接種)を完了した12歳以上

#### ■4回目接種対象者(3回目接種を完了した方)

重症化リスクが高い等の理由で4回目の対象となっている方で、接種券がお手元にある方は優先して接種を受けることができます。同時に松浦市では**社会的機能を維持するために必要な業種の従事者(教職員・保育施設職員・警察署職員・エッセンシャルワーカー等)**の方を対象に優先して接種を実施しますので、市内に勤務している方は職場を通じて、市外に勤務している方は健康ほけん課にご連絡ください。

その他の60歳未満の4回目接種対象者の方には、3回目接種を受けた時期が早かった方から、順次オミクロン株対応2価ワクチン接種で使用する「4回目用接種券」を送付します。

#### ■3回目接種対象者(初回接種を完了した方)

3回目接種対象者の方には、2回目接種から5か月経過を目安に接種券を送付しています。令和4年4月30日までに2回目接種を受けた方には、3回目用接種券を送付していますので、届いている接種券を使用してオミクロン株対応2価ワクチン接種を受けてください。紛失された場合は再発行申請を行ってください。

#### ▶再発行申請のお問合せ先

市役所健康ほけん課 電話 0956-72-1111(平日:8時30分~17時15分)

#### ■初回接種(1・2回目)がまだの方

オミクロン株対応2価ワクチン接種の対象ではありません。まずは従来型ワクチン接種を完了してください。松浦市の初回接種は市内医療機関1か所(志佐町 中山レディースクリニック)で実施します。

オミクロン株対応2価ワクチン接種対象と接種開始時期に関しては、右頁にわかりやすくイラストを載せています。


### お知らせ 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種について

**インフルエンザワクチンに限り、新型コロナワクチン(小児用ワクチンを含む)との同時接種が可能**となりました。他のワクチンについては、新型コロナワクチンの前後に予防接種をする場合は、13日以上の間隔をおき、同時接種もできませんのでご注意ください。

## オミクロン株対応2価ワクチン接種対象と接種開始時期



### 接種対象 初回接種(1・2回目接種)を完了した12歳以上



## 使用するワクチン



		1・2回目	3回目以降
ファイザー社製	従来型	○	×
	2価	×	12歳以上
モデルナ社製	従来型	○	×
	2価	×	18歳以上

※2022年9月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

## オミクロン株対応2価ワクチンの効果

### ■ 従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。


オミクロン株対応ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。

そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る**重症化予防効果**とともに、持続期間が短い可能性があるものの、**感染予防効果**や**発症予防効果**も期待されています。

### ■ 2価のワクチンであることにより、様々な新型コロナウイルスに反応します。

異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。

そのため、**今後の変異株に対して有効である可能性**がより高いことが期待されています。



## オミクロン株対応2価ワクチンの安全性

ファイザー社及びモデルナ社の2価ワクチンの薬事承認において、ファイザー社製、モデルナ社製のどちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られました。

〈接種後7日間に現れた症状〉

発現割合	症状	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位の痛み	注射部位の痛み、疲労
10～50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐
1～10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

参考:厚生労働省「〈新型コロナワクチン接種〉オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種が開始されます。」

コロナウイルスに感染した方のワクチン接種について

体調が回復してから3か月が目安であると厚生労働省から示されていますが、早期に接種を受けることは可能です。ただし、**体調回復後少なくとも1か月は経過してから接種することをお勧めします。**

## 5歳から11歳の小児の3回目ワクチン接種について



子どもの感染者数の増加とともに、重症者数も増加傾向にあります。初回接種後、時間経過とともに発症予防効果が低下しますが、追加接種(3回目接種)を行うことにより、効果が回復すると報告されています。

松浦市では**10月1日から3回目接種を開始します**。ぜひ、お子様と一緒に3回目接種をご検討ください。

接種できる医療機関は、松浦市内では**1か所(志佐町 坂口こどもクリニック)**です。

初回接種(1・2回目)がまだの方も引き続き接種を実施します。

### 接種の対象と使用するワクチン



- 1・2回目接種を完了した5～11歳のお子様を対象です。
- 1・2回目接種を完了し、5か月以上、間隔を空けて接種します。
- ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します(※)。
- (※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。


### 新型コロナワクチンの効果

3回目接種をすることで、感染しても症状が出にくくなります

5～11歳の子どもに対するワクチンの追加接種後は、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する中和抗体価(※)が上昇します。

また、時間経過とともに低下した初回接種による発症予防効果が、追加接種により回復すると報告されています。

(※)ウイルスの感染力や毒素の活性を中和できる抗体の値のこと



### 新型コロナワクチンの安全性

1・2回目接種の後と比べると、おおむね同様の症状が見られ、2回目接種時を上回るリスクは報告されていません。

【5～11歳の接種後7日間に現れた症状発現率の比較(ファイザー社ワクチンを使用)】

報告割合	接種後の症状(2回目接種後⇒3回目接種後の症状の発現率)
50%以上	疼痛(72.2⇒73.9)
10～50%	疲労(46.6⇒45.6%) 頭痛(30.1⇒34.0%) 筋肉痛(12.5⇒18.3%)
1～10%	発熱(8.8⇒6.7%) 関節痛(5.5⇒6.7%) 下痢(6.5⇒4.9%) 嘔吐(1.8⇒2.4%)

参考:厚生労働省「5歳から11歳のお子様の保護者の方へ〈新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ〉」

ワクチン接種に関する各お問い合わせ先 ※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意ください。

接種手続等の一般的な問合せ	副反応等の専門的な問合せ	接種券の発行
松浦市コールセンター 095-821-4601 月～金曜日 9時～17時	長崎県コロナワクチンコールセンター 電話:0120-764-060 24時間(土日祝含む) FAX:0800-080-6976(聴覚障害者向け)	松浦市役所健康ほけん課 0956-72-1111 月～金曜日 8時30分～17時15分