じん臓の機能障害の状況及び所見

（該当するものを○でかこむこと）

身長　　ｃｍ　体重　　ｋｇ

＊慢性透析療法実施中の場合は、透析療法実施直前の状態の検査データを記載のこと。

1　じん機能（　　年　　月　　日）

ア　内因性クレアチニンクリアランス値　（　　ml/分）測定不能

イ　血清クレアチニン濃度　（　　mg/dl）

ウ　血清尿素窒素濃度　（　　mg/dl）

エ　24 時間尿量　（　　ml/日）

オ　尿　所　見（　　）

2　その他参考となる検査所見

（胸部エックス線写真，眼底所見，心電図、eGFR 等）

3　臨床症状（該当する項目が有の場合は，それを裏づける所見を右の〔　〕内に記入すること。）

ア　じん不全に基づく末梢神経症　（有・無）〔　　〕

イ　じん不全に基づく消化器症状　（有・無）〔食思不振，悪心，嘔吐，下痢〕

ウ　水分電解質異常　（有・無）　Na　　mEq/l，K　　mEq/l

Ca　　mEq/l，P　　mg/dl

浮腫，乏尿，多尿，脱水，肺うっ血，

その他（　　）

エ　じん不全に基づく精神異常　（有・無）〔　　〕

オ　エックス線写真所見における骨異栄養症（有・無）〔高度，中等度，軽度〕

カ　じん性貧血　（有・無）　Hb　　g/dl，Ht　　%

赤血球数　　$\times 10^4/mm^3$

キ　代謝性アシドーシス　（有・無）〔HCO_3　　mEq/l〕

ク　重篤な高血圧症　（有・無）　最大血圧／最小血圧

／　　mmHg

ケ　じん疾患に直接関連するその他の症状　（有・無）〔　　〕

4　現在までの治療内容

（慢性透析療法の実施：　　年　　月　　日開始・予定（回数　　／週，）

5　日常生活の制限による分類

ア　家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動については支障がなく，それ以上の活動でも著しく制限されることがないもの。

イ　家庭内での普通の日常生活活動又は社会での極めて温和な日常生活活動には支障がないが，それ以上の活動は著しく制限されるもの。

ウ　家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障がないがそれ以上の活動は著しく制限されるもの。

エ　自己の身辺の日常生活活動を著しく制限されるもの。